

DM ANNALES AGF : 2011- 2025

Tutorat 2024-2025 : 60 QCMS – Durée : 60 min



Coucou tout le monde, c'est Lucacide, je reprends le DM annales de ma vieille Saradius qui a repris elle-même le DM annales de notre grande vieille Elisacrum qui a collecté tous les qcms sur le cours AGF de 2011 à 2023 ! Elles vous ont mis en gris les items hors programme. J'ai revérifié et mis en gris ce qui n'est plus au programme pour vous et je vous ai rajouté les qcms de 2025 !

Merci aux vieux qui ont fait un travail énorme !

Je me dois de vous dire deux mots avant que vous commenciez : Ces QCM sont pour la plupart non représentatifs de ce qui tombera le jour J. Si vous voulez vous entraînez correctement entraînez-vous sur les plus récents. Ce que je trouve particulièrement intéressant c'est de pouvoir s'entraîner sur des qcms fait par différents profs et donc de balayer toutes les perspectives sur chaque cours. Faites-le en gardant à l'esprit ça !

QCM 1 : À propos de la vulve on peut dire que : la fausse

- A) Les petites lèvres forment le capuchon du clitoris
- B) Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent de part et d'autre du méat urétral
- C) L'hymen disparaît presque complètement après l'accouchement
- D) Le bulbe vestibulaire est un corps érectile qui enserre le vestibule de la vulve
- E) Le clitoris s'insère sur les branches descendantes pubiennes

QCM 2 : Les moyens de fixité de l'utérus sont : la fausse

- A) Les ligaments ronds
- B) Les ligaments utéro-sacrés (lame sacro-recto-génito-pubienne)
- C) Le paracervix
- D) Le paramètre
- E) Les formations péritonéales des ligaments triangulaires de l'utérus

QCM 3 : À propos de la vulve on peut dire que :

- A) Le drainage lymphatique se fait vers les nœuds glutéaux
- B) Elle est innervée par le 5^{ème} nerf lombaire spinal
- C) Le mont de vénus ou mont du pubis est une masse lymphatique
- D) Les glandes vestibulaires majeures s'ouvrent dans le canal de l'urètre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : Les moyens de fixité de l'utérus sont :

- A) L'urètre
- B) L'uretère
- C) La lame sacro-recto-génito-pubienne
- D) Le noyau fibreux central du périnée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 :

Une exérèse des glandes vestibulaires majeures peut entraîner une sécheresse du pudendum (vulve)

PARCE QUE

Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent dans l'urètre et lubrifient le pudendum (vulve) en période d'excitation sexuelle

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 6 :

L'examen au spéculum du vagin ne permet pas de voir le col de l'utérus d'une femme déflorée nullipare

PARCE QUE

Le col de l'utérus d'une femme nullipare présente un orifice externe circulaire régulier et de petite taille

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
 - B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
 - C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
 - D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
 - E) Le fait et la raison sont tous les deux faux
-

QCM 7 :

L'ouverture de la grande cavité péritonéale ne permet pas de voir les ovaires

PARCE QUE

Les ovaires sont des glandes endocrines et exocrines non péritonisée et sous péritonéales

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 8 :

On dit que l'utérus est antéversé et antéfléchi

PARCE QUE

De part et d'autre du corps de l'utérus se trouvent les ligaments larges dont l'aileron antérieur est sous tendu par le ligament rond

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 9 : À propos du ligament large de l'utérus, on peut dire que :

- A) L'aileron supérieur est le mésosalpinx
- B) L'aileron postérieur forme le mésovarium
- C) L'aileron antérieur est sous tendu par le ligament rond
- D) Le paramètre forme la base du ligament large
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 :

Le médecin légiste qui examine une jeune fille qui a été violée alors qu'elle était vierge s'attend à retrouver au niveau de l'hymen des caroncules myrtiformes

PARCE QUE

Lors de la première pénétration sexuelle complète de la femme il y a déchirure du frein des petites lèvres

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 11 :

La destruction des glandes vestibulaires majeures de Bartholin qui s'abouchent dans le sillon entre petite et grande lèvres, peut entraîner une sécheresse vaginale gênante lors du coït

PARCE QUE

Ce sont les seules formations anatomiques lubrifiantes des organes génitaux de la femme

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 12 : **Le ligament rond de l'utérus est l'élément essentiel de la stabilité et de la fixation de l'utérus**

PARCE QUE

L'utérus est antéversé et antéfléchi dans le plan sagittal

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 13 :

On nomme fornix l'entrée du vagin

PARCE QUE

Le fornix, qui veut dire en latin arche ou voûte, enserre la racine de la verge de l'homme lors du coït

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 14 :

L'ovaire est le seul organe non péritonisé dans la cavité péritonéale

PARCE QUE

Oviductes et utérus sont péritonisés et sont en situation sous péritonéale

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 15 : **À propos de l'ovaire, on peut dire que :**

- A) C'est une glande intra-péritonéale péritonisée
- B) Son cortex a une fonction exocrine
- C) Sa médulla a une fonction endocrine
- D) Le mésovarium est une formation péritonéale qui forme l'aileron postérieur du ligament large et qui s'insère au pourtour du hile
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : À propos de la filière génitale on peut dire que :

- A) Le vagin a la forme d'un étui avec une face antérieure et supérieure et une face postérieure et inférieure
- B) Le col de l'utérus d'une femme multipare a un orifice externe comparé à un museau de tanche
- C) L'utérus présente un angle de rétroversion et de rétroflexion
- D) On appelle fornix du vagin la division de la colonne antérieure du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 :

Lorsqu'une femme présente une bartholinite infectieuse (infection de la glande vestibulaire majeure) avec écoulement purulent on s'attend à retrouver un écoulement au niveau du sillon labial du pudendum (sillon inter labial de la vulve)

PARCE QUE

C'est à ce niveau que s'abouche le conduit de la glande vestibulaire majeure

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 18 : Au niveau du vestibule du pudendum, on peut voir :

- A) Le méat externe de l'uretère
- B) L'orifice du canal des 4 glandes vestibulaires majeures
- C) L'orifice du vagin
- D) De nombreux poils
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : À propos de l'hymen on peut dire que :

- A) L'hymen semi-lunaire est une variété morphologique de l'hymen de la femme vierge
- B) Les caroncules myrtiformes reçoivent l'abouchement des glandes vestibulaires majeures
- C) Les caroncules myrtiformes sont une variété de l'hymen de la femme vierge
- D) Le muscle constricteur de la vulve est dans l'épaisseur de l'hymen
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : À propos du péritoine qui tapisse les organes pelviens et à propos du ligament large, on peut dire que :

- A) L'aileron postérieur du ligament large enveloppe l'ovaire
- B) L'aileron antérieur du ligament large est sous tendu par l'urètre pelvien
- C) Le méso-salpinx fait partie de l'aileron supérieur
- D) La base du ligament large forme le paramètre et contient l'aileron latéral ou cardinal de la lame sacro-recto-génito-pubienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : À propos du vagin, on peut dire que :

- A) Il est tapissé sur ses parois externes par le péritoine
- B) Son fornix est en rapport direct avec le trigone vésical
- C) La colonne postérieure du vagin est trifurquée en regard du trigone vésical
- D) Les crêtes transversales du vagin ou rides du vagin augmentent avec l'âge et le nombre de grossesses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : À propos des organes génitaux externes de la femme on peut dire que :

- A) Les caroncules hyménales sont visibles chez la femme vierge n'ayant pas subi de pénétration vaginale
- B) Le frein du clitoris provient des grandes lèvres
- C) Les petites lèvres présentent les caroncules myrtiformes après l'accouchement
- D) Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent au niveau de l'orifice urétral

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 23 : À propos du ligament large de l'utérus on peut dire que :

- A) L'aileron antérieur est tendu par l'uretère
- B) Le méso-salpinx forme l'aileron supérieur
- C) Le mésovarium forme l'aileron postérieur
- D) La base du ligament large s'élargit vers le bas
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : À propos du vagin, on peut dire que :

- A) Il est exclusivement vascularisé par des collatérales de l'artère iliaque externe
- B) Il se projette en regard de la tubérosité obturatrice
- C) Il est majoritairement sous le muscle élévateur de l'anus (lévator ani)
- D) Le trigone de Pawlick vaginal répond au triangle rectal de Lieutaud
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 : À propos de l'utérus, on peut dire que :

- A) L'angle d'antéversion utéro-vaginal est de 90°
- B) L'angle d'antéflexion utéro-vaginal est de 90°
- C) La couche musculaire la plus interne est circulaire
- D) La couche musculaire intermédiaire est plexiforme
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 26 : À propos de l'ovaire, on peut dire que :

- A) Il existe trois ligaments responsables des moyens de fixité de l'ovaire : lombo-ovarien, tubo-ovarien et utéro-ovarien
- B) L'ovaire est le seul organe entièrement péritonisé
- C) La vascularisation artérielle de l'ovaire est assurée par l'artère ovarique, issue de l'aorte abdominale et par les rameaux tubaires et ovariens issus de l'artère utérine, elle-même issue de l'artère iliaque interne
- D) La veine ovarique droite se draine dans la veine rénale droite
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 27 : À propos du vagin, on peut dire que

- A) La paroi antérieure et supérieure est comparable au palais d'un chien
- B) Les crêtes transversales (rides) des parois sont bien visibles chez la femme nullipare
- C) Le fornix est le lac spermatique
- D) L'axe du col de l'utérus fait un angle de 90° avec l'axe du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 28 : À propos de l'utérus, on peut dire que :

- A) La couleur naturelle du col est violette ou acajou
- B) Les plis palmés sont les plis muqueux à l'intérieur du corps de l'utérus
- C) L'utérus est rétroversé et rétrofléchi
- D) Le myomètre est composé uniquement par des fibres plexiformes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 29 : L'ovaire est un organe intra-péritonéal non péritonisé

PARCE QUE

L'ovaire est dans la grande cavité péritonéale et que sa surface n'est pas recouverte de péritoine

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fautive
- D) Le fait est faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 30 : Les cancers de l'ovaire peuvent rapidement envahir le péritoine de la grande cavité péritonéale

PARCE QUE

L'ovaire n'est pas recouvert par le péritoine viscéral permettant ainsi aux cellules cancéreuses d'envahir rapidement la grande cavité péritonéale

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 31 : Le ligament large de l'utérus présente trois ailerons péritonéaux

PARCE QUE

Il existe un aileron supérieur sous-tendu par le ligament rond, un aileron antérieur sous-tendu par le ligament utéro-ovarien et un aileron postérieur sous-tendu par l'oviducte

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 32 : Les cancers de l'ovaire droit peuvent donner rapidement des métastases péritonéales avec ascite

PARCE QUE

L'ovaire droit est péritonisé et intra-abdominal

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 33 : Le ligament large a trois ailerons

PARCE QUE

L'aileron antérieur est sous-tendu par le ligament utero-ovarien, l'aileron moyen est sous-tendu par l'oviducte et l'aileron postérieur par le ligament utérosacré

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 34 :

Le toucher vaginal permet d'explorer le cul-de-sac de Douglas recto-utérin

PARCE QUE

Ce cul-de-sac est en arrière du fornix du vagin

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet

- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 35 : Chez une femme adulte vierge et nullipare examinée et installée en position de taille ou gynécologique on peut :

- A) Constater que l'anus n'a pas de pli radié
- B) Voir les caroncules hyménéales myrtiformes
- C) Après introduction d'un spéculum pour vierge, voir l'orifice étoilé du canal du col de l'utérus
- D) Constater que le frein du clitoris est en avant et au-dessus du gland du clitoris
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 36 : À propos des ligaments larges de l'utérus on peut dire que :

- A) Ils sont en avant et en arrière de l'utérus
- B) Que l'aileron supérieur est sous-tendu par le ligament rond
- C) Que l'aileron antérieur est sous-tendu par l'artère ombilicale
- D) Que l'aileron postérieur est sous-tendu par le plexus hypogastrique supérieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 37 : Le cancer de l'ovaire est d'emblée un cancer de la grande cavité péritonéale

PARCE QUE

L'ovaire est un organe intra-péritonéale déperitonisé

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 38 : Le ligament large de l'utérus présente 4 ailerons

PARCE QUE

L'aileron antérieur est sous-tendu par le ligament rond, l'aileron supérieur par l'oviducte, l'aileron postérieur par le ligament utéro-ovarien et l'aileron inférieur par l'uretère

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 39 :

Lors de l'examen endovaginal le badigeonnage du col de l'utérus au lugol est régulièrement utilisé

PARCE QUE

Le lugol donne une coloration acajou au col sain alors s'il existe un cancer celui-ci se colore en bleu foncé

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 40 : On dit que la muqueuse du corps et du col de l'utérus présente des plis palmés

PARCE QUE

La muqueuse interne de l'utérus présente des plis horizontaux sur toute son étendue

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 41 : L'orifice externe du col de l'utérus varie au cours de la vie génitale de la femme

PARCE QUE

Chez la femme nullipare il est régulier circulaire ou aplati transversalement, chez la primipare il présente une ou deux incisures, chez la multipare les lèvres de l'orifice externe sont irrégulières avec les cicatrices de nombreuses déchirures

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 42 :

L'examen médico-légal d'une femme vierge qui a été violée avec pénétration vaginale, retrouve les caroncules myrtiformes de l'hymen

PARCE QUE

Les caroncules myrtiformes de l'hymen sont retrouvées immédiatement après la défloration

- A) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts et liés par une relation de cause à effet
- B) Le fait et la raison proposés sont tous les deux exacts mais ne sont pas liés par une relation de cause à effet
- C) Le fait est exact mais la raison proposée est fausse
- D) Le fait et faux mais la raison proposée est exacte
- E) Le fait et la raison sont tous les deux faux

QCM 43 : On peut dire de l'ovaire que :

- A) C'est une glande exocrine et endocrine
- B) Sa corticale sécrète les œstrogènes
- C) Sa médullaire sécrète la progestérone
- D) Il a la taille d'une grosse mandarine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 44 : À propos du ligament large de l'utérus on peut dire que :

- A) Le paramètre est la base du ligament large
- B) Le mésomètre s'élargit vers le bas et donne le paramètre
- C) Le méso-salpinx est l'aileron supérieur du ligament large
- D) Le mésovarium (ou mésovarium) est l'aileron antérieur du ligament large
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 45 : À propos de la filière génitale et urinaire de la femme on peut dire que :

- A) L'urètre passe au-dessus de la symphyse pubienne
- B) Le vagin est oblique en haut et en arrière
- C) L'utérus est antéversé et antéfléchi
- D) L'examen au spéculum du vagin permet de voir le col de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 46 : À propos du col de l'utérus on peut dire que :

- A) Il est rouge cerise ou violet à l'état normal
- B) Le lugol le colore en blanc
- C) L'acide acétique le colore en bleu clair
- D) Le cancer du col est coloré en vert par l'acide acétique alors que le reste du col est bleuté
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 47 : À propos des touchers pelviens on peut dire que :

- A) Lors du toucher vaginal les doigts de l'examineur peuvent aller jusqu'au fornix du vagin
- B) Lors du toucher rectal le doigt de l'examineur remonte jusqu'au cul de sac péritonéal recto-vaginal
- C) Lors du toucher vaginal on peut palper le col de l'utérus
- D) Lors du toucher vaginal les doigts de l'examineur ne remontent pas jusqu'au point le plus bas de la grande cavité péritonéale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

- **Année 2020-2021**

QCM 48 : À propos de l'utérus, on peut dire que :

- A) Le col est rosé à l'examen clinique standard
- B) Le col est acajou après badigeonnage à l'acide acétique
- C) Le col est rosé après badigeonnage au Lugol
- D) Le col est visible après examen au spéculum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

- **Rattrapages 2020-2021 PASS (L'Anat PB existait pas encore):**

QCM 49 : À propos du col de l'utérus on peut dire que :

- A) À l'examen au spéculum il est spontanément rosé
- B) Le badigeonnage au lugol lui donne une couleur acajou
- C) Le badigeonnage à l'acide acétique lui laisse sa couleur rosée
- D) Il est visible au niveau du fornix du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 50 : À propos du ligament large de l'utérus, on peut dire que :

- A) Le mésomètre s'insère sur la partie latérale de l'utérus
- B) L'aileron antérieur est le mésofuniculaire sous-tendu par le ligament rond
- C) L'aileron supérieur est le mésosalpinx sous-tendu par l'oviducte
- D) L'aileron postérieur est le mésovarium
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

- **Année 2022-2023 : QCMs rédigés par le Pr Baqué**

QCM 51 : Concernant l'appareil génital de la femme, sur une vue périnéale : quelle(s)est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) L'appareil génital de la femme est dans sa totalité recouvert de péritoine
- B) Le sillon génito-fémoral sépare les petites lèvres des grandes lèvres
- C) Les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin) se trouvent à la partie antérieure du vestibule du vagin au contact du méat urétral
- D) L'hymen circulaire est le nom que l'on donne à l'aspect de l'hymen après l'accouchement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 52 : Concernant le vagin, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Le fornix vaginal postérieur correspond au lac spermatique
- B) La face antérieure du vagin présente une colonne antérieure qui se trouve en regard de l'urètre
- C) Le triangle (trigone) vaginal se trouve sur la paroi postérieure du vagin
- D) Au niveau de la face postérieure du vagin, les rides et colonnes sont moins marquées que sur la face antérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 53 : Concernant l'utérus, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Le col de l'utérus se projette en regard de l'épine sciatique sur une vue de profil du bassin
- B) Le ligament rond de l'utérus est tendu entre la corne utérine et le mont du pubis puis les grandes lèvres
- C) Le péritoine recouvre le fond utérin
- D) Le myomètre tapisse la cavité utérine et suit le cycle féminin (desquamation menstruelle)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 54 : Concernant l'oviducte, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Il présente les plis palmés au niveau de l'ampoule tubaire
- B) La fécondation entre gamète mâle et femelle se fait dans la cavité utérine
- C) L'oviducte n'est pas tapissé de péritoine
- D) L'ovaire est une glande uniquement endocrine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 55 : Concernant l'examen gynécologique, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Le toucher vaginal permet d'explorer le fornix vaginal
- B) L'examen au speculum permet d'inspecter visuellement l'ostium de l'oviducte
- C) L'orifice utérin de la femme multipare au niveau du col de l'utérus est circulaire et régulier lors de l'examen au speculum
- D) La coloration du col de l'utérus à l'acide acétique apparaît rosée en l'absence de pathologie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 56 : Concernant l'appareil génital de la femme, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Le périnée est défini par l'ensemble des parties molles situées au-dessus du niveau du diaphragme pelvien
- B) Les petites lèvres dépassent vers le bas le niveau des grandes lèvres chez la femme en période d'activité génitale
- C) L'axe du vagin forme un angle de 65° par rapport à l'horizontale
- D) L'angle vaginal est de 135° ouvert vers l'arrière
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 57 : Concernant la filière génitale, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) L'angle d'antéversion physiologique de l'utérus par rapport au vagin en anatomie modale est d'environ 50°
- B) L'angle entre le corps et le col de l'utérus est de 135° (antéflexion utérine)
- C) La face antérieure de l'utérus repose sur la face postérieure de la vessie (et donc sur le trigone vésical)
- D) La cloison vésico-vaginale se situe entre la face postérieure de la vessie et la paroi antérieure du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 58 : Concernant l'anatomie génitale de la femme et les ligaments utérins, quelle(s) est (sont) la (les) réponses exactes ?

- A) Le ligament lombo-ovarien est longé par l'artère utérine
- B) Le ligament utéro-ovarien réunit l'ovaire au col de l'utérus
- C) Le ligament rond de l'utérus s'engage dans l'orifice inguinal profond
- D) Les ligaments sont recouverts de péritoine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 59 : Concernant le récessus recto-génital (ou recto-utérin ou cul de sac de Douglas), quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Il est limité latéralement par les ligaments sacro-utérins recouverts de péritoine (torus uterinus)
- B) Il est limité en arrière par la paroi antérieure du rectum
- C) Il est limité en avant par l'utérus
- D) Il est l'endroit le plus déclive de la cavité péritonéale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 60 : Concernant l'appareil génital et ses rapports, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) L'appendice iléo-caecal, en position pelvienne, est classiquement en rapport étroit avec l'ovaire gauche
- B) Le meso-salpinx constitue l'aileron supérieur du ligament large
- C) Une colique néphrétique droite peut prendre le masque d'une pathologie digestive (appendicite), génitale (pathologie annexielle) ou vasculaire (stase veineuse)

- D) Sur une coupe para-sagittale du ligament large, le méso du ligament utéro-ovarien se trouve en arrière par rapport au méso qui recouvre le ligament rond de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

- **Année 2023-2024 : QCM pas rédigés par Baqué**

QCM 61 : Concernant les organes génitaux féminins, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) L'ensemble des organes génitaux féminins sont sous-péritonéaux sauf l'ovaire qui est non-péritonisé et intrapéritonéal
- B) Le périnée cutané est de forme losangique avec un triangle antérieur uro-génital et un triangle postérieur anal
- C) Les $\frac{3}{4}$ antérieurs du périnée cutané sont innervés par les nerfs spinaux L1/ L2
- D) Les $\frac{3}{4}$ antérieurs du périnée cutané sont innervés par les nerfs spinaux S2 / S3 / S4 formant le nerf pudendal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 62 : Concernant le périnée cutané, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Le clitoris présente un frein antérieur et un capuchon postérieur
- B) Le méat urétral est situé en avant du clitoris et il est entouré des glandes para-urétrales (de Skene) sécrétant un lubrifiant
- C) À la partie postérieure du vestibule on retrouve les glandes vestibulaires majeures dont l'inflammation peut donner une bartholinite
- D) Les grandes lèvres et les petites lèvres sont séparées par le sillon inter-labial
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 63 : Concernant la vulve de la femme, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) L'hymen annulaire, semi-lunaire ou cribriforme sont spécifiques de la femme ayant déjà accouché
- B) L'hymen avec des caroncules hyménéales est spécifique de la femme vierge
- C) L'hymen avec des caroncules myrtiformes se retrouve chez la femme ayant déjà accouché
- D) Le clitoris présente un corps, un genou et un gland
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 64 : Concernant les organes génitaux internes de la femme, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Le trigone vaginal est situé sur la paroi postérieure du vagin sous le col de l'utérus
- B) L'utérus est le plus souvent antéversé et il est composé d'un fond, d'un corps, d'un isthme et d'un col de l'utérus
- C) L'utérus est fixé aux grandes lèvres par le ligament rond de l'utérus
- D) L'utérus présente une tunique externe (sérouse péritonéale sur le fond et fascia utérin latéralement) ainsi qu'une tunique musculaire (le myomètre) et une tunique interne (endomètre)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 65 : Concernant les organes génitaux internes de la femme, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) La fécondation se fait en général au niveau de l'ampoule de l'oviducte
- B) L'ovaire est une glande endocrine et exocrine
- C) L'examen au spéculum d'une femme nullipare retrouve un col avec plusieurs diverticules et irrégularités
- D) Le col utérin sain présente une couleur rosée après badigeonnage avec de l'acide acétique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 66 : Concernant le col de l'utérus, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) Après badigeonnage avec de l'acide acétique, le cancer du col de l'utérus est de couleur blanche
- B) Le col utérin sain présente une couleur rosée après badigeonnage avec du Lugol
- C) Après badigeonnage avec du Lugol, le cancer du col de l'utérus est de couleur blanche
- D) Après badigeonnage avec du Lugol, le cancer du col de l'utérus est de couleur acajou
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 67 : Concernant le ligament large, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

- A) La partie basse du ligament large est formée par le mésomètre en bas et le paramètre en haut
- B) L'aileron antérieur du ligament large se forme autour de l'oviducte (la trompe) et s'appelle le méso-salpinx
- C) L'aileron supérieur du ligament large se forme autour du ligament rond et s'appelle le méso-funiculaire
- D) L'aileron supérieur du ligament large se forme autour de l'ovaire et s'appelle le mésovarium
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

- **Année 2024-2025 : QCM pas rédigés par Baqué**

QRM 68 : Concernant la paroi du vagin, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) À l'examen au spéculum d'une patiente allongée sur le dos, le gynécologue voit, lorsqu'il regarde horizontalement, la paroi antérieure du vagin
- B) La limite inférieure du triangle de Pawlick se projette au niveau du sillon vésico-vaginal
- C) La limite supérieure du triangle de Pawlick se projette au niveau du sillon cervico-vaginal
- D) Les rides vaginales sont disposées transversalement par rapport à l'axe du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 69 : Concernant l'appareil génital, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les glandes bulbo-urétrales (de Cowper) s'abouchent au niveau de la paroi postérieure du vagin
- B) Les glandes vestibulaires (de Bartholin) s'abouchent à la face postérieure de l'urètre membraneux
- C) Les glandes urétrales se situent au niveau du périnée postérieur
- D) Le muscle bulbo-spongieux comprime le corps caverneux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 70 : Concernant l'ovaire, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'ovaire est un organe non péritonisé et en position intra-péritonéale
- B) La frange ovarique (de Richard) n'est pas en contact avec l'ovaire
- C) La médulla ovarienne sécrète les œstrogènes
- D) C'est une glande endocrine et exocrine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 71 : Concernant l'orifice vaginal du col, après mise en place d'un spéculum, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Chez la nullipare, l'orifice vaginal du col de l'utérus est allongé et irrégulier
- B) L'aspect de la muqueuse du col utérin est rosé en l'absence de cancer après application d'acide acétique, lors du dépistage
- C) L'aspect de la muqueuse du col utérin est blanchâtre en présence d'un cancer après application d'acide acétique
- D) L'aspect normal de la muqueuse du col utérin après coloration au lugol prend une coloration acajou, ce qui n'est pas le cas (pas de prise de coloration) sur une lésion cancéreuse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 72 : Concernant l'urètre chez la femme, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les glandes para-urétrales correspondent aux glandes vestibulaires de Bartholin
- B) Les glandes para-urétrales s'abouchent dans le clitoris
- C) Dans le fascia vésico-vaginal se trouve du péritoine
- D) La brièveté de l'urètre de la femme explique la fréquence des infections urinaires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 73 : Concernant le périnée féminin, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le triangle postérieur du losange périnéal est appelé également le triangle uro-génital
- B) L'innervation du $\frac{1}{4}$ antérieur du périnée est assurée par les racines des nerfs spinaux L3 et L4
- C) L'innervation des $\frac{3}{4}$ postérieur du périnée est assurée par les racines des nerfs spinaux S2, S3 et S4
- D) Les racines des nerfs spinaux S2, S3 et S4 correspondent aux racines du nerf pudendal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 74 : Concernant le pudendum, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les grandes lèvres sont réunies en avant par une commissure antérieure
- B) Les grandes lèvres sont réunies en arrière par une commissure postérieure
- C) Les petites lèvres sont réunies en avant par une commissure antérieure
- D) Les petites lèvres sont réunies en arrière par une commissure postérieure

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 75 : Concernant l'hymen de la femme vierge, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Il peut être labié
- B) Il peut être cribriforme
- C) Il peut être annulaire
- D) Il peut présenter des caroncules hyménéales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 76 : Concernant les corps érectiles de la femme, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le clitoris est formé par la réunion des 2 piliers droit et gauche
- B) Les bulbes vestibulaires sont entourés d'un fascia
- C) Les glandes vestibulaires majeures sécrètent de la cyprine qui permet la lubrification des voies génitales pendant les rapports sexuels
- D) Les muscles ischio-caverneux et bulbo-spongieux sont des muscles en forme de cornet
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 77 : Concernant le péritoine pelvien et le ligament large, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Il s'agit d'une formation péritonéale paire et symétrique qui recouvre les annexes de l'utérus (sauf l'ovaire)
- B) Le péritoine pelvien recouvre la face antérieure de l'utérus
- C) Le péritoine pelvien recouvre la face postérieure de l'utérus
- D) Le péritoine recouvre la totalité du col de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 78 : Concernant la partie supérieure du ligament large, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) La réflexion du péritoine autour du ligament rond de l'utérus forme le mésovarium
- B) La réflexion du péritoine pelvien autour de l'oviducte (trompe) forme le méso-funiculaire
- C) La réflexion du péritoine autour du ligament utéro-ovarien forme le méso-salpinx
- D) La réflexion du péritoine pelvien autour de l'ovaire forme le méso-salpinx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 79 : Concernant le ligament large, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'aileron antérieur du ligament large correspond au méso-funiculaire
- B) L'aileron supérieur du ligament large correspond au méso-salpinx
- C) L'aileron postérieur du ligament large correspond au mésovarium
- D) Le péritoine pelvien recouvre le pavillon de la trompe
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 80 : Concernant la vascularisation des organes génitaux de la femme, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les artères à destinée utérine et vaginale sont le plus souvent d'origine iliaque externe
- B) Le drainage lymphatique du périnée se fait vers les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels (trigone fémoral de Scarpa)
- C) Le drainage lymphatique de l'utérus se fait vers les nœuds lymphatiques le long des vaisseaux iliaques internes
- D) Le drainage lymphatique de l'utérus se fait essentiellement vers les nœuds lymphatiques disposés de part et d'autre de la crosse de la veine saphène
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

