

DM n°3 : AGF – Rajouts

Tutorat 2025-2026 : 10 QCMS – Durée : 10 min



QCM 1 : À propos de l'anatomie de surface et du périnée cutanée féminin, donnez la (les) réponse(s) vraie(s) :

- A) En position gynécologique, la patiente est couchée sur le dos, on peut voir deux triangles accolés par leurs bases
- B) Les poils pubiens de la femme sont triangulaires alors que ceux de l'homme sont losangiques
- C) Entre la racine des membres inférieurs et la vulve on retrouve le sillon inter-cuisso-vulvaire
- D) Les grandes lèvres sont toujours plus grandes que les petites lèvres, en termes de taille
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos du périnée cutanée féminin, donnez la (les) réponse(s) vraie(s) :

- A) Le prépuce clitoridien, aussi appelé capuchon, peut subir une circoncision comme chez l'homme
- B) Les glandes de Bartholin sont juste sous la peau
- C) L'hymen ferme le hiatus uro-génital
- D) La première rupture après pénétration de l'hymen donne des saignements. C'est sa cicatrisation qui donne les caroncules hyménéales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos des corps érectiles, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le corps caverneux de la femme est le bulbe vestibulaire
- B) Le corps caverneux de la femme est le clitoris
- C) Le corps spongieux de la femme est le bulbe vestibulaire
- D) Le corps spongieux de la femme est le clitoris
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : À propos des corps érectiles, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le clitoris est comme coupé en deux par le vagin, il l'entoure, à cause de l'embryologie
- B) Le muscle bulbo-spongieux entoure le bulbe vestibulaire
- C) Le muscle ischio-caverneux entoure le clitoris
- D) Les muscles en cornets qui entourent les corps érectiles permettent l'érection clitoridienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos des corps érectiles et des muscles, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les corps caverneux sont insérés sur la membrane périnéale
- B) Le muscle transverse profond est dans le même plan que le muscle constricteur du vagin
- C) Le muscle constricteur de l'uretère est dans le même plan que le muscle constricteur de la vulve
- D) C'est le muscle constricteur de la vulve qui peut donner un vaginisme (impossibilité de copuler)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos du vagin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'axe général du vagin croise la vertèbre L3
- B) Le vagin est l'organe de la copulation mais il sert aussi à expulser le bébé lors de l'accouchement par voie naturelle
- C) Le vagin est un organe musculo-muqueux
- D) Vagin vient de « vagina » en latin qui veut dire épée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos du vagin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Ses rides sont des replis muqueux verticaux à son axe, elles sont nombreuses chez l'enfant et diminuent avec l'âge
- B) Les colonnes sont des replis muqueux transversaux, il y en a 2 (une antérieure et une postérieure)
- C) La colonne antérieure se bifurque en haut donnant le trigone vaginal
- D) Les sillons sont au nombre de 3 : sillon vésico-vaginal, sillon cervico-vaginal et sillon intra-urétral
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos du vagin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La limite supérieure du trigone vaginal est le sillon vésico-vaginal
- B) La limite inférieure du trigone vaginal est le sillon infra-urétral
- C) Les ponctions dans le trigone de Pawlick font arriver dans la vessie et risquent de créer des fistules ano-vaginales
- D) Les ponctions en arrière du fornix bien exécutées font arriver dans le cul-de-sac de Douglas
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos de l'utérus, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'utérus est l'organe de la gestation, il a une cavité accueillant le bébé
- B) On peut décrire au col de l'utérus une partie supra-vaginale et une partie intra-vaginale
- C) De bas en haut on voit : l'exocol, l'endocol, le canal cervical et l'orifice interne du col de l'utérus
- D) Endocol et exocol forment l'orifice interne du col de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos de la vascularisation utérine et vaginale, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'artère utérine est une branche de l'artère génitale
- B) L'artère utérine est très proche de l'uretère ce qui constitue un danger chirurgical en cas de ligature de l'artère
- C) D'un côté elle donne l'artère utérine, très sinueuse, et d'un autre côté elle donne l'artère vaginale
- D) Cette configuration permet le déploiement de l'artère quand l'utérus est gravide et qui grossit
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos de la vascularisation utérine et vaginale, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Une anastomose entre système génital et utérin fait que l'utérus dépend aussi de la vascularisation ovarique
- B) L'artère ovarique suit le ligament sacro-utérin
- C) Les anastomoses se font au sein du ligament large, c'est pour cela que les ailerons sont des mésos
- D) Il y a une vascularisation lymphatique importante
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos des angles des organes génitaux internes, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La vessie fait un angle avec l'horizontal de 60° ouvert vers l'arrière
- B) L'angle vaginal existe à cause du faisceau pubo-rectal ou levator ani, il fait un angle de 135° ouvert vers l'arrière
- C) L'angle cervico-vaginal est de 90° ouvert vers l'avant, il donne l'antéversion de l'utérus, il existe grâce au faisceau pubo-utérin
- D) L'angle du cap anal est de 110° ouvert vers l'avant
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) À cause de l'angulation, lors d'un examen gynécologique, on voit la paroi antérieure du vagin
- B) Les annexes regroupent les trompes et les ovaires, c'est l'appareil de la fécondation
- C) Une seule frange ovarique est en contact de la gonade, c'est la frange ovarique de Richard
- D) L'ovaire ressemble à un œuf de pigeon de 2-3cm, petit et blanc
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les ovaires ne sont pas péritonisés pour que les œufs rejoignent la trompe
- B) Les chirurgies de l'abdomen peuvent entraîner des problèmes de fertilité chez la femme
- C) L'aspect lisse des ovaires disparaît après les pontes successives
- D) L'utérus est mobile dans la cavité pelvienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : À propos des ligaments, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le système ligamentaire permet d'éviter la chute de la matrice pour éviter les prolapsus
- B) Le ligament rond relie le corps utérin aux petites lèvres en passant par l'orifice inguinal profond
- C) Le ligament propre de l'ovaire relie le pôle supérieur de l'ovaire aux cornes utérines
- D) Le ligament lombo-ovarien relie la gonade à la région lombaire à cause de son origine embryologique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : À propos des ligaments, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le ligament sacro-utérin relie le col de l'utérus au sacrum, il forme le taurus utérinus
- B) Il y a un ligament large droit et un ligament large gauche
- C) Le ligament large c'est les replis pairs et symétrique de péritoine pariétal tendu de l'utérus à la paroi
- D) Le péritoine est posé sur les viscères pelviens comme un linge mouillé sur des filins d'acier
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : À propos des organes de la cavité pelvienne, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le rectum a une portion péritonisée et une portion intra-péritonéale
- B) Un des dangers de la coelioscopie est l'hémorragie de l'aorte abdominale (surtout chez l'enfant)
- C) En vue de coelioscopie on peut voir le vagin couché sur la vessie
- D) L'appendice est très proche de l'ovaire et de l'uretère, c'est le flirt appendiculo-ovarien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : À propos des touchers pelviens, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le toucher vaginal est un toucher pelvien bidigital
- B) La mobilisation utérine permet de palper la taille de l'utérus, s'il est fibrosé ou s'il est douloureux
- C) La mobilisation utérine est faite avec deux doigts dans le vagin et une main qui palpe en sus-pubien
- D) Le toucher rectal servait beaucoup, aujourd'hui il est dépassé par les techniques comme les scanners
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : À propos des pathologies de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) vraie(s) :

- A) Les cancers du col de l'utérus sont lymphophiles et se propagent sexuellement
- B) La salpingite est une infection de l'ovaire
- C) Les fistules (vésico-vaginales par exemple) sont très faciles à traiter
- D) La douleur en fosse iliaque droite est une douleur peu commune devant faire penser immédiatement à l'appendicite
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La glande mammaire est au-dessus du petit pectoral, qui lui-même est au-dessus du grand pectoral
- B) Le petit pectoral permet de lever le bras (élever la scapula)
- C) Le grand pectoral s'accroche sur l'acromion alors que le petit s'accroche sur le haut de l'humérus
- D) La glande mammaire se projette au niveau de la vertèbre Th4 en dedans de la ligne médio-claviculaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La glande mammaire est de forme arrondie, elle a un prolongement thoracique
- B) Le prolongement de la glande mammaire peut être pris pour un nodule
- C) Elle comprend 15 à 20 canaux lactifères qui s'abouchent sur la plaque aréolo-mamelonnaire
- D) Les glandes de Montgomery s'abouchent sur la papille du mamelon
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Elle est contenue dans un dédoublement du fascia profond
- B) Les retinaculum cutanés (crêtes de Duret) s'étendent du fascia à la peau et font que la glande est adhérente à la peau
- C) La bourse rétro-mammaire de Chassaignac permet la mobilité de la glande par rapport au plan musculaire
- D) Elle est touchée par un cancer qui concerne 1 femme sur 2
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 23 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) On distingue deux types de cancers : les cancers canaux et lobulaires
- B) Les cancers canaux sont moins fréquents et moins agressifs
- C) Les cancers lobulaires sont plus fréquents et les plus agressifs
- D) Une perte de mobilité mammaire par rapport au plan musculaire signe un envahissement tumoral
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le signe de la peau d'orange est signe d'inflammation tumorale
- B) La manœuvre de Tillaux permet de palper les adénopathies axillaires
- C) Pour tester la bourse rétro-mammaire de Chassaignac on fait une abduction contrariée du bras et on mobilise la glande mammaire
- D) On classe les ganglions de la zone par la classification de Berg, il y a 3 étages
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Avant de traiter un cancer du sein on teste la mobilité de la glande par rapport au plan musculaire
- B) Avant de traiter un cancer du sein on fait une recherche de ganglion sentinelle
- C) Si le ganglion sentinelle est indemne on procède à un curage ganglionnaire axillaire complet
- D) Un curage ganglionnaire axillaire complet provoque des lymphoedèmes du membre supérieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses