



QCM 1 : À propos de l'introduction à l'étude de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) On divise, pour simplifier, l'appareil génital en une partie interne et une externe
- B) Dans la partie externe on retrouve, de bas en haut : le vagin, l'utérus, les trompes et les ovaires ; chez la femme
- C) Le vagin est l'organe de la femme, il permet la copulation
- D) L'utérus est l'organe de la mère, il permet la gestation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos des organes génitaux externes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Le petit bassin est un espace limité en haut par le détroit supérieur
- B) Quand on fait un examen clinique à un ou une patiente on voit d'abord le périnée musculaire
- C) Une femme est examinée en position dorso-pectorale et aura une dizaine d'examen périnéaux dans sa vie
- D) Sur une vue de face on délimite d'arrière en avant un losange périnéal comme suit : la symphyse pubienne, les deux tubérosités ischiatiques et le coccyx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos des organes génitaux externes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Le losange périnéal est découpé en deux triangles : un postérieur anal et un antérieur urogénital
- B) Le triangle postérieur contient l'anus. Le triangle antérieur contient par exemple le clitoris
- C) Ces deux triangles, donc le losange, contiennent les organes génitaux de la femme
- D) Il est innervé comme suit : le quart antérieur par les rameaux antérieurs de L1 et L2 ; le reste par les racines S2 à S4.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : À propos des organes génitaux externes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Plus en avant de la vulve se trouve de la graisse qui permet d'amortir les chocs pendant les rapports sexuels
- B) Les poils du mont de vénus sont de section plurigonale. On peut y retrouver des poux pubiens
- C) Les grandes lèvres, comme les petites lèvres sont imberbes et sont limitées par des commissures antérieures et postérieures
- D) Les nymphes ne sont pas délimitées des grandes lèvres
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos des organes génitaux externes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) La commissure antérieure a une partie antérieure qui forme le capuchon du clitoris. À l'inverse sa partie postérieure forme le frein du clitoris
- B) Les glandes para-urétrales sont aussi appelées glandes de Bartholin
- C) Une infection des glandes de Bartholin donne des bartholinites pouvant nécessiter jusqu'à une excision des glandes
- D) Les glandes vestibulaires de Skene sécrètent la cyprine pour lubrifier les rapports sexuels.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos des formes de l'hymen, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) En consultation je vois une femme avec un hymen labié, j'en conclus qu'elle est vierge
- B) En consultation je vois une femme avec un hymen cribriforme, j'en conclus qu'elle est multipare
- C) En consultation je vois une femme avec un hymen à caroncule, j'en conclus qu'elle est déflorée
- D) Une jeune fille à l'hymen semi-lunaire aura des premières règles douloureuses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos des corps érectiles de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Ils sont en superficie du périnée cutané et entourés de muscles en cornets pour améliorer l'intumescence
- B) Les femmes ont des corps érectiles dit parfaits car le clitoris rentre aussi en érection
- C) Le clitoris se voit bien sur une vue de face. Il s'insère sur la branche inférieure du pubis. On lui décrit des piliers, un corps, un genou et un gland. Il est retenu par un ligament à la symphyse pubienne
- D) Les bulbes vestibulaires ressemblent au corps caverneux de l'homme, ils ont une érection réelle
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Le vagin est un organe qui se projette sur l'ischion en faisant un angle de 60° avec l'horizontal. Il a une forme légèrement convexe en avant
- B) D'avant en arrière, sur une vue de profil du petit bassin, on voit l'urètre, le vagin et le rectum
- C) Le vagin mesure une dizaine de cm de long

- D) L'éjaculation de l'homme se fait vers le haut du vagin, au niveau de son dôme appelé aussi fornix, voule ou lac spermatique
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) On peut comparer l'aspect du vagin à un palais de chien à cause de ses rides et de ses colonnes
B) Les rides vaginales augmentent avec l'âge de la femme
C) Il y a deux colonnes : la colonne antérieure (celle qui est la plus marquée) et la colonne postérieure qui garde la trace de l'urètre à cause de l'inclinaison du vagin
D) On constate un trigone vésical sur la face postérieure du vagin
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) L'utérus est antéflexé et antévachi quand on le regarde sur une vue latérale
B) De bas en haut on trouve le fond de l'utérus, son corps, son isthme et son col
C) La tunique externe est toujours formée de péritoine
D) Il y a une tunique moyenne qui correspond au myomètre et une tunique interne qui suit le cycle féminin
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) On trouve des cornes aux angles latéraux de l'utérus, c'est l'endroit où sont accrochées les trompes allant à la gonade
B) Lors de l'examen du col de l'utérus je vois un orifice annulaire et régulier, j'en conclus que la femme est primipare
C) Lors de l'examen du col de l'utérus je vois un orifice aplati et régulier, j'en conclus que la femme est vierge
D) Lors de l'examen du col de l'utérus je vois un orifice expansé, j'en conclus que la femme est multipare
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos des organes génitaux internes féminin, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Elle a une structure assez spécifique qui ne lui permet aucune flexibilité pour que la gonade reste en place
B) La fécondation a lieu dans l'isthme de la trompe
C) L'oviducte est péritonisé alors que la gonade ne l'est que peu
D) La partie corticale de la gonade est seulement sécrétrice d'œstrogènes
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : À propos des rapports péritonéaux et des ligaments, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Le ligament large est une formation issue du péritoine et relie l'utérus aux parois pelviennes
B) On compte 3 éléments appelés ailerons et qui constituent à eux seuls ce ligament large
C) Le méso-funiculaire est l'aileron supérieur et est sous-tendu par le ligament rond
D) L'aileron postérieur est sous-tendu par l'oviducte
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : À propos des rapports péritonéaux et des ligaments, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Sur un utérus de profil, de bas en haut, on observe le mésomètre, le paramètre (plus effilé) puis les ailerons
B) Le péritoine est une sorte de filme qui recouvre les organes de la cavité pelvienne entièrement
C) On constate parfois un cul-de-sac utéro-vésical entre la vessie et l'utérus
D) Après avoir recouvert les bords supérieur et latéraux de l'utérus le péritoine va former un cul-de-sac recto-vagino-utérin. C'est la partie la plus déclive du péritoine
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : À propos de l'examen gynécologique de la femme, donnez la (les) réponse(s) exactes :

- A) Le toucher vaginal peut servir à examiner le col de l'utérus chez une femme n'ayant eu aucun rapport sexuel
B) Le toucher rectal permet d'examiner la voule du vagin
C) Après un examen au spéculum accompagné d'une coloration du col par de l'acide acétique : si le col est rosé, l'examineur exécutera une biopsie
D) Après un examen au spéculum accompagné d'une coloration du col par du Lugol : si le col est rosé, l'examineur exécutera une biopsie
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : À propos de l'Appareil Génital Féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) On le divise en partie externe (vagin, utérus, oviductes et ovaires) et partie interne (vulve)
B) Le triangle antérieur est innervé par les rameaux antérieurs des racines L1 et L2
C) Le triangle postérieur est innervé par les rameaux antérieurs des racines S2-S3-S4 formant le nerf pudendal
D) La partie antérieure des organes génitaux externes est de la graisse (mont de vénus) qui amorti les chocs pendant les rapports sexuels

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : À propos du périnée cutanée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le mont du pudendum porte des poils à section polygonale qui permettent aux poux pubiens de s'y agripper
- B) Plus en avant de ces poils on trouve les grandes lèvres, limitées en avant et en arrière par des commissures (antérieure et postérieure)
- C) En dedans des grandes lèvres on trouve les nymphes. Grandes et petites lèvres sont séparées par un sillon interlabial
- D) La partie antérieure de la commissure postérieure des nymphes forme le capuchon du clitoris
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : À propos du périnée cutanée, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Entre les nymphes on trouve le vestibule du vagin et le méat urétral
- B) Le méat urétral est entouré par les glandes vestibulaires majeures de Bartholin, qui sécrètent un liquide lubrifiant pendant les rapports sexuels
- C) Au niveau moyen postérieur du vestibule, on retrouve les glandes para-urétrales de Skene, qui produisent un liquide lubrifiant pendant la copulation
- D) Des infections des glandes vestibulaires donnent des Bartholinites. Elles peuvent mener à l'excision des glandes et plus tard à une sécheresse du pudendum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : À propos la coupe sagittale du petit bassin chez la femme, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La face antérieure de la vessie est en rapport avec la face postérieure du vagin
- B) Le noyau fibreux central du périnée possède des sphincters
- C) Le cul de sac recto-vagino-utérin correspond au cul de sac de douglas, le point le plus déclive de la cavité abdominale
- D) Le cul de sac de douglas correspond à un renforcement de la plèvre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : Concernant les organes génitaux internes féminins, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les ovaires sont des glandes amphicrines rétropéritonéales
- B) Le ligament rond se projette en regard du trigone vésical
- C) Le col de l'utérus de la femme vierge peut avoir un aspect labié
- D) Le ligament utéro-ovarien est sous-tendu par la trompe utérine pour former le méso-salpinx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : À propos de l'Appareil Génital Féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'appareil génital de la femme est intra-péritonéal, sauf l'ovaire qui est non péritonisé et sous-péritonéale
- B) En dessous du détroit supérieur on trouve le grand bassin
- C) Le losange périnéal a pour sommets : la symphyse pubienne en avant, les tubérosités ischiatiques à droite et à gauche et le coccyx en arrière
- D) L'orifice anal étant dans le triangle postérieur, lui-même inclus dans le losange uro-génital il est considéré comme un organe génital
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : Médecin aux urgences, une femme se présente pour un examen à la suite de violences qu'elle ne veut pas décrire. Quel(s) scénario(s) est (sont) exact(s) ?

- A) Un hymen labié, annulaire ou à caroncules sera la preuve que la patiente est vierge
- B) Un hymen cribiforme sera la preuve que la patiente a subi au moins une pénétration
- C) Si l'on voit un hymen à caroncules myrtiformes, on peut deviner que la patiente a subi au moins une pénétration
- D) Si l'on voit des caroncules hyménéales, on peut deviner que la patiente a subi au moins une pénétration
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 23 : À propos de l'Appareil Génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La femme, comme l'homme, a deux corps caverneux et deux corps spongieux
- B) La femme est capable d'une érection parfaite grâce au clitoris
- C) L'utérus est la partie qui accueillera le pénis de l'homme lors de la copulation, mesurant 8 cm de long environ
- D) Le lieu de l'éjaculation masculine est la partie inférieure du vagin : le fornix/lac spermatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : À propos de l'Appareil Génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'aspect en palais de chien du vagin est en grande partie à cause des rides vaginales
- B) L'utérus est antéversé et antéfléchi en vue latérale comportant de haut en bas : le fond, le corps, l'isthme et le col

C) De l'intérieur vers l'extérieur on note le péritoine (ou le fascia utérin), le myomètre et l'endomètre à propos de l'utérus

D) Un col ayant plusieurs expansions est une femme qui a eu un seul accouchement / une femme primipare

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 : À propos de l'Appareil Génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

A) La trompe a plusieurs portions, est flexible et présente une membrane interne semblable à celle de l'utérus

B) L'ovaire est une glande exocrine uniquement et intrapéritonéale de la taille et de la forme d'une amande

C) Le méso-salpinx est l'aileron supérieur. C'est une formation de péritoine sous-tendue par la trompe

D) Le mésovarium est l'aileron postérieur. C'est une formation de péritoine sous-tendue par le ligament utéro-ovarien

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 26 : Vous êtes gynécologue et vous recevez une patiente pour une coloration du col de l'utérus pour un contrôle régulier. Quelle(s) proposition(s) est (sont) juste(s) ?

A) Le col est rosé après une coloration à l'Acide Acétique. Je biopsie la zone et je penche pour un diagnostic cancéreux

B) Le col est rosé et blanc après une coloration à l'Acide Acétique. Je biopsie la zone et je penche pour un col sain

C) Le col est acajou et blanc après une coloration au Lugol. Je biopsie la zone et je penche pour un col cancéreux

D) Le col est rosé et acajou après une coloration au Lugol. Je ne biopsie pas la zone et je penche pour un col sain.

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 27 : À propos des formes d'hymen de la femme, cochez la (les) réponse(s) exacte(s) :

A) La forme de l'hymen d'une femme permet de déterminer la vie génitale de la femme (surtout pour des questions médico-légales)

B) On recense une forme d'hymen pour les femmes ayant eu une pénétration : hymen à caroncules myrtiformes

C) Une femme ayant eu un accouchement aura un hymen présentant des caroncules hyménéales

D) On peut retrouver 4 formes d'hymen pour les femmes vierges (labié, annulaire, aplati ou régulier)

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 28 : À propos des corps érectiles de la femme, cochez la (les) réponse(s) exacte(s) :

A) Les corps érectiles sont en profondeur du périnée cutanée, ceux de la femme sont doués d'érections

B) Le clitoris est un de ces corps érectiles. Il a deux piliers (visible en vue latérale) s'insérant sur la branche inférieure du pubis

C) Le clitoris a des piliers, un corps, un genou et un gland retenu par un ligament suspenseur à la symphyse pubienne. Ce dernier peut être lésé dans les traumatismes du bassin

D) Les bulbes vestibulaires sont des muscles en cornets entourant les corps érectiles, ils sont enveloppés d'un fascia. le tout entoure l'introït vaginal

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 29 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

A) Les muscles en cornets sont impairs car le muscle constricteur de la vulve est unique (ce muscle est en dedans du bulbo-spongieux et de la glande de Bartholin)

B) Le muscle constricteur de la vulve est très présent chez la femme jeune puis disparaît après les accouchements

C) Le vagin fait un angle de 80° avec l'horizontale, légèrement concave en arrière, il est en arrière et dessous la vessie

D) Lors de la pénétration, le col de l'utérus s'efface pour laisser de la place au pénis et à son éjaculation qui se fera dans le fornix

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 30 : À propos de la description du vagin par Ambroise Paré, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

A) Les rides vaginales disparaissent avec l'âge et les grossesses

B) La colonne antérieure est très marquée. elle part de la base du vagin pour se diviser dans sa partie supérieure en trigone vaginal

C) Le trigone vaginal de Pawlick est la projection du trigone vésical sur la colonne antérieure du vagin

D) La colonne postérieure se trouve sur la face postérieure mais présente des plis/rides très estompées

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 31 : À propos de l'utérus, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

A) La matrice est un organe musculaire ressemblant à un tronc de cône aplati de profil

B) De haut en bas on parle du fond de l'utérus, de l'isthme, du corps et du col

C) Sur la face antérieure de l'utérus il y a du fascia utérin alors que sur la face supérieure on trouve du péritoine

D) La tunique moyenne est le myomètre. C'est une monocouche musculaire qui aura des myométromes s'il présente des cancers

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 32 : À propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) bonne(s) réponse(s) :

- A) L'ovaire est un organe non péritonisé mais intra-péritonéal
- B) La gonade féminine ou ovaire assure des fonctions endocrine et exocrine
- C) La fécondation a lieu dans le pavillon de l'oviducte
- D) La trompe a la forme et la dimension d'un tuyau de plombier
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 33 : À propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) bonne(s) réponse(s) :

- A) Le vagin est l'organe de la gestation
- B) Le vagin a une paroi antérieure qui correspond le moins à la définition de palais de chien
- C) Le trigone vaginal ou trigone de Pawlick imprime sa forme sur le trigone vésical
- D) D'avant en arrière on trouve le vagin, l'urètre et le rectum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 34 : Marie Loestrogène se présente en consultation gynécologique. Vous ne connaissez pas cette patiente, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Son col de l'utérus a quelques irrégularités, vous en déduisez qu'elle est nullipare
- B) Son col de l'utérus a plusieurs irrégularités, vous en déduisez qu'elle est multipare
- C) Son hymen est labié, elle a donc probablement déjà eu des rapports sexuels
- D) Son hymen présente des caroncules hyménéales, elle a probablement eu un accouchement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 35 : OpiaCédric et sa femme, Juliantalgette, sortent de stage de médecine nucléaire. Ils vont aux urgences pour des douleurs du petit bassin, donnez la (les) bonne(s) réponse(s) :

- A) Je peux faire un toucher rectal à OpiaCédric. J'explorerai alors son cul-de-sac de Douglas. S'il crie lors de cet examen, il a probablement une inflammation péritonéale
- B) Juliantalgette peut recevoir un toucher vaginal pour explorer son col de l'utérus, et ce, peu importe sa vie génitale
- C) Je dois d'abord m'assurer que Juliantalgette est déflorée pour effectuer un toucher vaginal
- D) Si on suspecte un cancer chez Juliantalgette on peut alors colorer son col de l'utérus à l'acide acétique ou au lugol puis biopsier les zones cancéreuses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 36 : Namasté et sa compagne, Ophélysine, viennent vous voir pour des problèmes érectiles, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Vous lui affirmez que les corps érectiles sont en profondeur du périnée cutanée et que ce sont les muscles en cornets qui donnent une intumescence (en accumulant du sang veineux)
- B) Les différents corps érectiles sont le clitoris et les bulbes vestibulaires entourés respectivement par les muscles en cornets que sont les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux
- C) Le clitoris est retenu à la symphyse pubienne par son ligament suspenseur
- D) Le clitoris a des piliers, un corps, un genou et un gland
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 37 : Osiris et Lauredose veulent arrêter la biochimie et devenir tutrice d'Anat PB mais elles vous demandent de l'aide. Donnez la (les) affirmation(s) exacte(s) :

- A) L'examen au spéculum permet de voir le rectum
- B) La coloration au Lugol colore la zone cancéreuse du col utérin en acajou
- C) La coloration à l'acide acétique permet de colorer la zone saine du col utérin en blanc
- D) Les culs-de-sac peuvent ne pas exister chez certaines personnes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 38 : À propos de l'utérus, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La tunique interne est le myomètre, elle présente des replis palmés au niveau de l'endocol
- B) C'est un organe antéversé et antéfléchi de face
- C) La tunique externe de l'utérus est l'endomètre. Elle est composée d'un fascia utérin sur le fond de l'utérus et du péritoine sur les côtés
- D) L'éjaculation se fait dans le lac spermatique utérin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 39 : À propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'oviducte est un tube qui permet au spermatozoïde de rejoindre l'œuf et à l'œuf d'aller s'implanter, une fois fécondé, dans la matrice
- B) Il y a une trompe par cornes utérine, à la structure assez semblable à celle de l'utérus (une muqueuse)
- C) On décrit plusieurs portions à cette trompe : intra-utérine courte, isthmique, l'ampoule (partie dilatée où la fécondation a lieu) et le pavillon

- D) Le pavillon présente des franges dont une, la frange ovarique de Richard, la plus longue, qui recouvre la gonade
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 40 : À propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La partie interne infundibulaire de la trompe est péritonisée alors que la gonade ne l'est pas
B) La partie périphérique ou organe de la femme de la gonade féminine produit des œstrogènes (fonction endocrine)
C) La partie médullaire ou organe de la mère de la gonade féminine produit les follicules et de la progestérone (fonction endocrine et exocrine)
D) La fonction endocrine du cortex repose sur la transformation du follicule en corps jaune sécréteur de progestérone
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 41 : À propos des ligaments et du péritoine, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le ligament rond relie le vagin à la graisse des grandes lèvres
B) Le ligament utéro-ovarien relie l'utérus et les ovaires
C) Le ligament large est du péritoine tendu entre les parois de la cavité pelvienne et l'utérus, il est un moyen de fixité pour ces organes
D) Chaque élément sous tendant du péritoine plus la portion de péritoine associée s'appelle un méso ou aileron. L'association de tous ces méso/ailerons forment le ligament large
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 42 : À propos des ligaments et du péritoine, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le méso-funiculaire ou aileron supérieur est du péritoine sous-tendu par l'oviducte
B) L'aileron antérieur est du péritoine sous-tendu par le ligament utéro-ovarien
C) Le mésovarium est du péritoine sous-tendu par le ligament rond
D) Le ligament se prolonge par le mésomètre (partie plus effilée), puis le paramètre (partie aux bords plus large). Ils sont la portion principale du ligament large
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 43 : À propos des rapports péritonéaux dans la cavité pelvienne, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le péritoine s'insère dans des recoins formant des culs-de-sac
B) On dit que le péritoine se dépose comme un linceul sur un un monstre allemand
C) On peut parler du cul-de-sac utéro-vésical qui se trouve entre la vessie et l'utérus
D) On peut parler du cul-de-sac recto-vagino-utérin ou cul-de-sac recto-vaginal ou cul-de-sac de Douglas qui est la partie la plus déclive de la cavité péritonéale
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 44 : À propos des différents examens gynécologique que l'on peut effectuer chez la femme, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le toucher vaginal se fait en insérant un doigt dans l'anus pour examiner la paroi postérieure du vagin
B) Le toucher rectal permet d'examiner le rectum en passant deux doigts dans le vagin
C) L'examen au spéculum permet de voir les parois du vagin et le col de l'utérus
D) Une fois l'examen au spéculum fait on peut décider de colorer le col de l'utérus
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 45 : À propos des colorations du col de l'utérus, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Une coloration à l'acide acétique colore le col sain en acajou et le col malade en rose
B) Une coloration au Lugol colore le col sain en acajou et le col malade en rose
C) Une coloration à l'acide acétique colore le col sain en rose et le col malade en blanc
D) Une coloration au Lugol colore le col sain en rose et le col malade en blanc
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 46 : À propos de l'Appareil Génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La corticale de l'ovaire peut aussi s'appeler organe de la mère, partie périphérique ou cortex
B) La médulla de l'ovaire peut aussi s'appeler organe de la femme
C) La corticale exerce des fonctions exocrine, en excréant les follicules vers la trompe, et endocrine car le follicule deviendra corps jaune qui sécrètera de la progestérone
D) La médulla sécrète des œstrogènes, c'est donc une fonction endocrine qu'elle exerce
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 47 : À propos de l'Appareil Génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le lieu de l'éjaculation s'appelle le lac spermatique, fornix, dôme du vagin ou voute du vagin
B) Le noyau fibreux central du périnée ne sert pas à grande chose dans la structure du petit bassin
C) Sur une coupe sagittale on voit bien que le vagin est concave en avant et en arrière de la vessie

- D) Le muscle constricteur de la vulve n'est pas un muscle en cornet mais devient de plus en plus puissant à force de l'utiliser lors des accouchements ou des pénétrations
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 48 : Vous êtes gynécologue et vous recevez une patiente pour un contrôle régulier. Quelle(s) proposition(s) est (sont) juste(s) ?

- A) Si je veux observer les parois du vagin de la patiente, il faudra exécuter un examen au spéculum du rectum
B) Si je veux palper le fornix de la patiente, il faudra exécuter un toucher rectal
C) Si je veux colorer le col de l'utérus de la patiente, il faudra faire un toucher vaginal
D) Si je veux confirmer qu'elle a une infection péritonéale il faudra faire un toucher vaginal et provoquer un cri de Douglas
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 49 : À propos de l'Appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'Anatomie) :

- A) Les limites du petit bassin sont en haut la ligne arquée et en bas le plancher pelvien
B) Chez une femme en position genu-pectorale, le périnée cutané en forme de losange comprend deux triangles : un postérieur urogénital et un antérieur anal
C) Les racines S1 et S2 forment le nerf pudendal innervant le tiers postérieur du périnée
D) La position de référence pour étudier un périnée est la position genu-pectorale
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 50 : À propos de l'Appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'Anatomie) :

- A) Les grandes lèvres sont des formations graisseuses permettant d'amortir les chocs lors d'un coït
B) Les lèvres (grandes et petites) sont imberbes
C) La partie postérieure de la commissure antérieure des grandes lèvres forme le frein du clitoris
D) la partie antérieure de la commissure antérieure des petites lèvres forme le prépuce clitoridien
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 51 : À propos de l'Appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'Anatomie) :

- A) Au niveau du vestibule antérieur du vagin s'abouchent les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin)
B) Au niveau du vestibule postérieur du vagin s'abouche les glandes de Skene
C) Au niveau du vestibule postérieur du vagin on retrouve l'hymen
D) Un toucher vaginal chez une femme non déflorée permet de voir l'hymen et d'attester de sa virginité
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 52 : À propos de l'Appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'Anatomie) :

- A) Le clitoris s'insère sur les branches inférieures de l'ilion et permet une intumescence érectile
B) Le clitoris a deux piliers, deux corps, un genou et un gland
C) Les bulbes vestibulaires sont des corps érectiles équivalent du corps spongieux chez l'homme
D) Les bulbes vestibulaires sont enveloppés d'un fascia et entourent l'introït vaginal et par extension le pénis
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 53 : À propos de l'Appareil génital féminin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'Anatomie) :

- A) Le ligament large est un moyen de fixité des organes génitaux internes féminins
B) Le ligament rond retient l'utérus aux parois de la cavité thoracique
C) Le ligament propre de l'ovaire relie la corne utérine et la gonade féminine
D) Le paramètre (portion du ligament large) relie vagin et matrice utérine pour limiter l'antéflexion de l'utérus
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 55 : À propos de l'Appareil génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le fond de l'utérus est recouvert de péritoine
B) Le myomètre est la couche qui tapisse la cavité utérine et qui suit les cycles menstruels
C) L'endocol présente des replis palmés au niveau de l'ampoule tubaire
D) L'intérieur de l'ovaire est tapissé de péritoine mais pas sa face externe
E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 56 : À propos de l'Appareil génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le périnée cutanée est la partie qui se situe au-dessus du plancher pelvien
B) Un examen au spéculum permet d'observer l'appareil génital féminin de la vulve au fond utérin

- C) L'utérus est antéversé et antéfléchi physiologiquement
- D) Les différentes colorations du col de l'utérus permettent de vérifier si l'utérus est sain
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 57 : À propos de l'Appareil génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Un toucher vaginal permet d'explorer le fornix ou la dilatation ampoulaire de l'oviducte (utile pour les grossesses débutantes)
- B) Un toucher rectal permet d'explorer le sillon médian prostatique et le lac spermatique en même temps
- C) L'ovaire est la gonade féminine qui a une activité uniquement exocrine
- D) L'ovaire a la taille et la forme d'une olive effilée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 58 : À propos de l'Appareil génital féminin, indiquez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le vagin a une légère forme concave en avant
- B) Chez une femme vierge on pourra observer un hymen avec des plis radiés
- C) Il existe un moyen de faire un toucher vaginal à une femme vierge en utiliser un spéculum plutôt que son index et son majeur
- D) Le méat urétral est en arrière du clitoris mais en avant de l'orifice vaginal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 58 : À propos des organes génitaux externes féminins, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'anatomie) ?

- A) D'avant en arrière, sur une vue périnéale, on retrouve les deux commissures antérieures, le clitoris, le méat urétral, l'orifice vaginal, les deux commissures postérieures et l'anus
- B) Un sillon inter-labial sépare les grandes lèvres des petites lèvres
- C) Le capuchon du clitoris forme en arrière le frein du clitoris
- D) Le méat urinaire est entouré de glandes para-urétrales (de Skene) produisant un lubrifiant
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 59 : À propos de l'hymen, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'anatomie) ?

- A) L'hymen se trouve au fond du vestibule du vagin
- B) Un hymen à caroncules myrtiformes se retrouve chez une femme ayant accouché
- C) Après une pénétration on peut observer un hymen à caroncules hyménéales
- D) La découverte d'un hymen labié ou cribriforme est typique d'une femme ayant eu une pénétration
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 60 : À propos du ligament large, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'anatomie) ?

- A) Le ligament large est une formation péritonéale regroupant les ailerons, le mésomètre et le paramètre
- B) L'aileron supérieur est le méso-funiculaire, il entoure la trompe
- C) L'aileron postérieur est le mésovarium, il entoure la trompe
- D) La partie la plus basse du ligament large est le mésomètre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 61 : À propos des organes génitaux internes de la femme, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'anatomie) ?

- A) Le vagin fait un angle avec l'horizontal de 60°, il est légèrement convexe en avant, en arrière et sous la vessie
- B) L'utérus a un fond supérieur, un corps central, un isthme et un col inférieur
- C) Les oviductes sont accrochés à chaque cornes utérines, sont flexibles et mènent le spermatozoïde à l'œuf
- D) L'ovaire est non péritonisée et a la forme et la taille d'une amande
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 62 : À propos de la coloration du col de l'utérus, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) (QCM relu par les professeurs d'anatomie) ?

- A) Un badigeonnage au Lugol colore le col colore en blanc la zone saine du col
- B) Un badigeonnage à l'acide acétique colore en acajou la zone cancéreuse du col
- C) Cet examen permet de biopsier la zone cancéreuse d'un col de l'utérus
- D) Le col de l'utérus peut être coloré lors d'un examen au spéculum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 63 : À propos du périnée de la femme, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le muscle transverse superficiel du périnée est dans le même plan que le muscle constricteur du vagin
- B) Le muscle constricteur du vagin/de la vulve est responsable du vaginisme (tonicité anormale)

- C) Le muscle constricteur du vagin est dans le même plan que le muscle constricteur de l'urètre
- D) Le muscle transverse superficiel du périnée recouvre le muscle transverse profond du périnée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 64 : À propos des angles et projections des organes de la cavité pelvienne, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'axe général du vagin se projette sur la vertèbre S3
- B) L'angulation vaginale de 135-145° existe à cause du muscle pubo-vaginal (faisceau du muscle pubo-coccygien)
- C) Cet angle vaginal (135-145°) est ouvert vers l'arrière
- D) L'angle cervico-vaginal est de 135-145°, il est ouvert vers l'avant et donne la position antéversée modale de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 65 : À propos des organes génitaux de la femme, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'utérus est l'organe de la copulation
- B) Le vagin est l'organe de la gestation
- C) La trompe est l'organe de la fécondation
- D) L'ovaire est l'organe de la gestation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 66 : À propos de l'anatomie de surface du périnée féminin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Entre les deux formations que sont les grandes et petites lèvres on trouve le sillon génito-fémoral
- B) Les poils pubiens chez la femme sont losangiques chez la femme alors qu'ils sont triangulaires chez l'homme
- C) Le clitoris a un prépuce (comme l'homme autour de son pénis). Il est sujet à la circoncision parfois
- D) En période d'activité sexuelle les petites lèvres dépassent les grandes lèvres
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 67 : À propos des glandes vestibulaires majeures (de Bartholin), donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin) s'abouchent à la partie postérieure de l'introït vaginal
- B) Les glandes vestibulaires majeures donnent des Bartholinites lorsqu'elles sont infectées
- C) Comme les glandes vestibulaires majeures sont abouchées au niveau postérieur de l'introït du vagin, il est important de ne pas confondre suppuration anale et suppuration vaginale
- D) Les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin) sécrètent un liquide lubrifiant le vagin lors de la copulation
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 68 : À propos de l'examen au spéculum, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Du fait des angulations des organes périnéaux, en position gynécologique et au spéculum on voit la paroi postérieure du vagin
- B) Les rides sont longitudinales et très nombreuses, elles disparaissent avec le temps
- C) Une colonne (repli muqueux horizontal) existe sur la face antérieure et sur la face postérieure du vagin
- D) La colonne antérieure est caractérisée par sa bifurcation supérieure en un trigone vésical/vaginal de Pawlick
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 69 : À propos des sillons de la paroi antérieure du vagin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les sillons sont plus visibles quand le gynécologue tire le col avec une pince Pozzi pendant un examen au spéculum
- B) Le sillon le plus bas situé est le sillon infra-urétral
- C) Le sillon vésico-vaginal limite en haut le trigone vésical/vaginal de Pawlick
- D) Le sillon cervico-vaginal limite en bas le trigone vaginal, il marque le début de la bifurcation de la colonne antérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 70 : À propos du trigone vésical de Pawlick, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le trigone vésical est formé par l'abouchement des deux uretères et par celui de l'urètre dans la vessie
- B) Ce trigone vésical correspond à la bifurcation de la colonne antérieure du vagin
- C) Une ponction dans le trigone de Pawlick ponctionne le contenu vésical
- D) Une ponction dans le trigone de Pawlick peut donner une fistule recto-vésicale, difficile à traiter
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 71 : À propos du col de l'utérus, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) On décrit une portion supra-vaginale au col
- B) On décrit une portion infra-vaginale au col
- C) On décrit une dilatation du col appelé sinus naviculaire cervical
- D) Lors d'une hystérocopie le gynécologue traverse l'endocol puis l'exocol (=orifice externe du col), le sinus naviculaire cervical puis l'orifice interne du col
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 72 : À propos de la gonade féminine, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'ovaire fait 2-3cm, il a la taille et la forme d'un œuf de pigeon, il est petit et blanc
- B) Dès le début de l'ovulation, des cicatrices apparaissent à chaque ponte. Le côté lisse de l'ovaire disparaît
- C) L'ovaire est relié à l'utérus par un ligament utéro-ovarien, aussi appelé ligament propre de l'ovaire
- D) L'ovaire est relié à la région lombaire par un ligament lombo-ovarien à cause de l'embryologie de la gonade
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 73 : À propos des corps érectiles de la femme, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les corps spongieux s'insèrent sur la membrane périnéale
- B) Le corps spongieux se met de part et d'autre du vagin, il a été découpé embryologiquement par le vagin
- C) Les corps érectiles se retrouvent en arrière de l'urètre et en avant du vagin pour donner le gland du clitoris
- D) Les muscles qui entourent les corps érectiles permettent une érection clitoridienne (intumescence)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 74 : À propos des cancers du col de l'utérus, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les cancers du col de l'utérus sont causés par un virus appelé papillomavirus
- B) La vaccination contre le papillomavirus a diminué le nombre de personnes touchées par ce cancer
- C) Une teinture au Lugol (à l'iode) permet de détecter des signes de dysplasie du col
- D) Dans les années 70-80 le nombre de cancers du col utérin était important, quasi épidémique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 75 : À propos des ligaments de la cavité pelvienne, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les cornes utérines sont reliées à la paroi antérieure de la cavité pelvienne par le ligament rond du foie
- B) Les ligaments sont des éléments assurant la fixité des organes pelviens
- C) Les ligaments utéro-ovarien relie les cornes utérines aux pôles supérieurs des ovaires
- D) Le ligament utéro-sacré relie le col de l'utérus à la paroi sacrée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 76 : À propos du dépôt de péritoine sur les organes pelviens, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Il tapisse la face profonde de la paroi puis la vessie, il va former un premier récessus utéro-vésical
- B) Il couvre le corps utérin puis forme un récessus recto-utérin appelé cul-de-sac de Douglas
- C) On retrouve des organes péritonisés comme le rectum, le colon sigmoïde ou l'utérus
- D) On retrouve des organes non péritonisés comme l'ovaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 77 : À propos des récessus du péritoine, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le cul de sac de Douglas est le point le plus déclive de la grande cavité péritonéale qui collecte tous les liquides inflammatoires de l'abdomen
- B) Le toucher rectal, bien plus précis que les scanners/IRM/échographie, peut provoquer le cri de Douglas lors d'inflammation du péritoine
- C) Une salpingite peut donner des douleurs très importantes lors d'un toucher pelvien et un abcès pelvien
- D) Une ponction du récessus recto-utérin mal effectuée peut donner une fistule vésico-vaginale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 78 : À propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La frange ovarique de Richard est la seule à être au contact de l'ovaire
- B) Une patiente aux antécédents chirurgicaux abdominaux peut rencontrer des problèmes de procréation avec son partenaire
- C) Le ligament rond est l'ensemble des formations péritonéales paires et symétriques qui recouvrent les annexes de l'utérus
- D) Il y a deux ligaments larges
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 79 : À propos de la coelioscopie et de la vue chirurgicale en coelioscopie, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Un des dangers de la coelioscopie est l'hémorragie de l'aorte abdominale (surtout chez les enfants)
- B) En coelioscopie on voit les organes de la cavité pelvienne d'en dessous
- C) Le plan veineux est plus superficiel que le plan artériel
- D) Les artères sont plus antérieures que les veines
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 80 : À propos de la loi de Louchka, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'uretère droit croise l'artère iliaque externe
- B) L'uretère gauche croise l'artère iliaque externe
- C) L'uretère droit croise l'artère iliaque commune
- D) L'uretère gauche croise l'artère iliaque primitive
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 81 : À propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'utérus est antéversé dans sa position modale physiologique, en vue supérieure il est couché sur la vessie
- B) La position de Trendelenburg permet de faire remonter la masse viscérale et de voir les organes pelviens
- C) Le cordon spermatique de l'homme est le ligament rond chez la femme
- D) Le ligament utéro-sacré forme une tore appelée Torus Utérinus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 82 : À propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le ligament large repose sur les annexes comme du linge mouillés sur des filins d'acier
- B) Les ailerons du ligament large sont des mésos car ce sont des lames porte-vaisseaux
- C) Le flirt appendiculo-ovarien représente le fait qu'on a dans la même région des organes qui donnent des pathologies très fréquentes
- D) On retrouve notamment dans cette zone des pathologies comme l'appendicite, les lithiases, les kystes ovariens, les torsions, les salpingites...
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 83 : À propos de l'anatomie de surface et du périnée cutanée féminin, donnez la (les) réponse(s) vraie(s) :

- A) En position gynécologique, la patiente est couchée sur le dos, on peut voir deux triangles accolés par leurs bases
- B) Les poils pubiens de la femme sont triangulaires alors que ceux de l'homme sont losangiques
- C) Entre la racine des membres inférieurs et la vulve on retrouve le sillon inter-cuisso-vulvaire
- D) Les grandes lèvres sont toujours plus grandes que les petites lèvres, en termes de taille
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 84 : À propos du périnée cutanée féminin, donnez la (les) réponse(s) vraie(s) :

- A) Le prépuce clitoridien, aussi appelé capuchon, peut subir une circoncision comme chez l'homme
- B) Les glandes de Bartholin sont juste sous la peau
- C) L'hymen ferme le hiatus uro-génital
- D) La première rupture après pénétration de l'hymen donne des saignements. C'est sa cicatrisation qui donne les caroncules hyménales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 85 : À propos des corps érectiles, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le corps caverneux de la femme est le bulbe vestibulaire
- B) Le corps caverneux de la femme est le clitoris
- C) Le corps spongieux de la femme est le bulbe vestibulaire
- D) Le corps spongieux de la femme est le clitoris
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 86 : À propos des corps érectiles, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le clitoris est comme coupé en deux par le vagin, il l'entoure, à cause de l'embryologie
- B) Le muscle bulbo-spongieux entoure le bulbe vestibulaire
- C) Le muscle ischio-caverneux entoure le clitoris
- D) Les muscles en cornets qui entourent les corps érectiles permettent l'érection clitoridienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 87 : À propos des corps érectiles et des muscles, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les corps caverneux sont insérés sur la membrane périnéale
- B) Le muscle transverse profond est dans le même plan que le muscle constricteur du vagin
- C) Le muscle constricteur de l'uretère est dans le même plan que le muscle constricteur de la vulve
- D) C'est le muscle constricteur de la vulve qui peut donner un vaginisme (impossibilité de copuler)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 88 : À propos du vagin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'axe général du vagin croise la vertèbre L3
- B) Le vagin est l'organe de la copulation mais il sert aussi à expulser le bébé lors de l'accouchement par voie naturelle

- C) Le vagin est un organe musculo-muqueux
- D) Vagin vient de « vagina » en latin qui veut dire épée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 89 : À propos du vagin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Ses rides sont des replis muqueux verticaux à son axe, elles sont nombreuses chez l'enfant et diminuent avec l'âge
- B) Les colonnes sont des replis muqueux transversaux, il y en a 2 (une antérieure et une postérieure)
- C) La colonne antérieure se bifurque en haut donnant le trigone vaginal
- D) Les sillons sont au nombre de 3 : sillon vésico-vaginal, sillon cervico-vaginal et sillon intra-urétral
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 90 : À propos du vagin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La limite supérieure du trigone vaginal est le sillon vésico-vaginal
- B) La limite inférieure du trigone vaginal est le sillon infra-urétral
- C) Les ponctions dans le trigone de Pawlick font arriver dans la vessie et risquent de créer des fistules ano-vaginales
- D) Les ponctions en arrière du fornix bien exécutées font arriver dans le cul-de-sac de Douglas
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 91 : À propos de l'utérus, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'utérus est l'organe de la gestation, il a une cavité accueillant le bébé
- B) On peut décrire au col de l'utérus une partie supra-vaginale et une partie intra-vaginale
- C) De bas en haut on voit : l'exocol, l'endocol, le canal cervical et l'orifice interne du col de l'utérus
- D) Endocol et exocol forment l'orifice interne du col de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 92 : À propos de la vascularisation utérine et vaginale, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) L'artère utérine est une branche de l'artère génitale
- B) L'artère utérine est très proche de l'uretère ce qui constitue un danger chirurgical en cas de ligature de l'artère
- C) D'un côté elle donne l'artère utérine, très sinueuse, et d'un autre côté elle donne l'artère vaginale
- D) Cette configuration permet le déploiement de l'artère quand l'utérus est gravide et qui grossit
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 93 : À propos de la vascularisation utérine et vaginale, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Une anastomose entre système génital et utérin fait que l'utérus dépend aussi de la vascularisation ovarique
- B) L'artère ovarique suit le ligament sacro-utérin
- C) Les anastomoses se font au sein du ligament large, c'est pour cela que les ailerons sont des mésos
- D) Il y a une vascularisation lymphatique importante
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 94 : À propos des angles des organes génitaux internes, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La vessie fait un angle avec l'horizontal de 60° ouvert vers l'arrière
- B) L'angle vaginal existe à cause du faisceau pubo-rectal ou levator ani, il fait un angle de 135° ouvert vers l'arrière
- C) L'angle cervico-vaginal est de 90° ouvert vers l'avant, il donne l'antéversion de l'utérus, il existe grâce au faisceau pubo-utérin
- D) L'angle du cap anal est de 110° ouvert vers l'avant
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 95 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) À cause de l'angulation, lors d'un examen gynécologique, on voit la paroi antérieure du vagin
- B) Les annexes regroupent les trompes et les ovaires, c'est l'appareil de la fécondation
- C) Une seule frange ovarique est en contact de la gonade, c'est la frange ovarique de Richard
- D) L'ovaire ressemble à un œuf de pigeon de 2-3cm, petit et blanc
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 96 : À propos de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Les ovaires ne sont pas péritonisés pour que les œufs rejoignent la trompe
- B) Les chirurgies de l'abdomen peuvent entraîner des problèmes de fertilité chez la femme
- C) L'aspect lisse des ovaires disparaît après les pontes successives
- D) L'utérus est mobile dans la cavité pelvienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 97 : À propos des ligaments, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le système ligamentaire permet d'éviter la chute de la matrice pour éviter les prolapsus
- B) Le ligament rond relie le corps utérin aux petites lèvres en passant par l'orifice inguinal profond
- C) Le ligament propre de l'ovaire relie le pôle supérieur de l'ovaire aux cornes utérines
- D) Le ligament lombo-ovarien relie la gonade à la région lombaire à cause de son origine embryologique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 98 : À propos des ligaments, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le ligament sacro-utérin relie le col de l'utérus au sacrum, il forme le taurus utérinus
- B) Il y a un ligament large droit et un ligament large gauche
- C) Le ligament large c'est les replis pairs et symétrique de péritoine pariétal tendu de l'utérus à la paroi
- D) Le péritoine est posé sur les viscères pelviens comme un linge mouillé sur des filins d'acier
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 99 : À propos des organes de la cavité pelvienne, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le rectum a une portion péritonisée et une portion intra-péritonéale
- B) Un des dangers de la coelioscopie est l'hémorragie de l'aorte abdominale (surtout chez l'enfant)
- C) En vue de coelioscopie on peut voir le vagin couché sur la vessie
- D) L'appendice est très proche de l'ovaire et de l'uretère, c'est le flirt appendiculo-ovarien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 100 : À propos des touchers pelviens, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le toucher vaginal est un toucher pelvien bidigital
- B) La mobilisation utérine permet de palper la taille de l'utérus, s'il est fibrosé ou s'il est douloureux
- C) La mobilisation utérine est faite avec deux doigts dans le vagin et une main qui palpe en sus-pubien
- D) Le toucher rectal servait beaucoup, aujourd'hui il est dépassé par les techniques comme les scanners
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 101 : À propos des pathologies de l'appareil génital féminin, donnez la (les) réponse(s) vraie(s) :

- A) Les cancers du col de l'utérus sont lymphophiles et se propagent sexuellement
- B) La salpingite est une infection de l'ovaire
- C) Les fistules (vésico-vaginales par exemple) sont très faciles à traiter
- D) La douleur en fosse iliaque droite est une douleur peu commune devant faire penser immédiatement à l'appendicite
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 102 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La glande mammaire est au-dessus du petit pectoral, qui lui-même est au-dessus du grand pectoral
- B) Le petit pectoral permet de lever le bras (élever la scapula)
- C) Le grand pectoral s'accroche sur l'acromion alors que le petit s'accroche sur le haut de l'humérus
- D) La glande mammaire se projette au niveau de la vertèbre Th4 en dedans de la ligne médio-claviculaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 103 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) La glande mammaire est de forme arrondie, elle a un prolongement thoracique
- B) Le prolongement de la glande mammaire peut être pris pour un nodule
- C) Elle comprend 15 à 20 canaux lactifères qui s'abouchent sur la plaque aréolo-mamelonnaire
- D) Les glandes de Montgomery s'abouchent sur la papille du mamelon
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 104 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Elle est contenue dans un dédoublement du fascia profond
- B) Les retinaculum cutanés (crêtes de Duret) s'étendent du fascia à la peau et font que la glande est adhérente à la peau
- C) La bourse rétro-mammaire de Chassaignac permet la mobilité de la glande par rapport au plan musculaire
- D) Elle est touchée par un cancer qui concerne 1 femme sur 2
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 105 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) On distingue deux types de cancers : les cancers canaux et lobulaires
- B) Les cancers canaux sont moins fréquents et moins agressifs
- C) Les cancers lobulaires sont plus fréquents et les plus agressifs
- D) Une perte de mobilité mammaire par rapport au plan musculaire signe un envahissement tumoral
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 106 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Le signe de la peau d'orange est signe d'inflammation tumorale
- B) La manœuvre de Tillaux permet de palper les adénopathies axillaires
- C) Pour tester la bourse rétro-mammaire de Chassaignac on fait une abduction contrariée du bras et on mobilise la glande mammaire
- D) On classe les ganglions de la zone par la classification de Berg, il y a 3 étages
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 107 : À propos de la glande mammaire, donnez la (les) réponse(s) exacte(s) :

- A) Avant de traiter un cancer du sein on teste la mobilité de la glande par rapport au plan musculaire
- B) Avant de traiter un cancer du sein on fait une recherche de ganglion sentinelle
- C) Si le ganglion sentinelle est indemne on procède à un curage ganglionnaire axillaire complet
- D) Un curage ganglionnaire axillaire complet provoque des lymphoedèmes du membre supérieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses