

Sémiologie dermatologique

I/ Anamnèse

- ATCD / Profession / prise médicamenteuse ++++
- Signes fonctionnels : prurit ++; brûlures ; douleurs...
- Modalités évolutives :
 - Mode début
 - Type de lésion élémentaire ++ : aspect initial / évolution de chaque lésion..
 - Évolution générale
 - TTT(s) appliqué(s)
 - Influence de l'environnement : physique (chaud/froid, soleil); professionnel; cosmétique

II/ Examen Physique

- Où examiner ? peau, muqueuses, phanères
- Comment ? regarder, toucher (palper, gratter avec curette)
- Analyser ? lésion élémentaire ++, groupement, topographie
- Lésions élémentaires :
 - primitives (processus initial) : macule, papule-nodule-végétations, vésicule-bulle, pustules, nouure
 - secondaires (évolution du processus) : croûtes, squames, érosion, ulcération, gangrène, cicatrice

1° Tache sans relief = MACULE

Macule = tache sans relief, ni infiltration (simple modification de la couleur de peau)

- Érythémateuse : effacement à la vitropression, ça gratte
généralisation de l'érythème à tout le tégument = érythrodermie (perte hydrosodée +)
- Purpurique : pas d'effacement à la vitropression (GR infiltrant le derme)
- Hypo/Achromique : perte de la coloration cutanée, lésions blanches (ex : vitiligo)
- Pigmentée : tache café au lait (ex : naevus sans relief, tache de naissance)

2° Lésions en relief

- Papule : pleine, ferme au toucher et taille < 1 cm
Épidermique (type psoriasis) ou dermique (œdème (urticair), cellules (lichen), substance)
- Nodule : ± enchâssé dans la peau et taille > 1 cm (carcinome spinocellulaire, hémangiome)
- Végétation / Verrucosité : lésion polylobée « en chou fleur » (hyperplasie épidermique)

3° Lésions liquidiennes

- Vésicules / Bulles = lésion translucide en relief contenant un liquide clair ou jaune citrin
1 à 3 mm/ >5mm épidermique >> sous-épidermique (varicelle, herpès, érosions post-vésiculeuses)
Bulle épidermique : flasque (pemphigus) et érosion post-vésiculeuse (impetigo)
Bulle sous-épidermique : tendue résistante (pemphigoïde) et piqure d'insecte
- Pustule = lésion blanc laiteux ou jaunâtre en relief contenant du pus (PNN, kératinocytes altérés)
folliculaire >> non folliculaire

4° Pertes de substance

- Erosion-fissure : perte de l'épiderme
- Ulcération : perte de l'épiderme et du derme
- Gangrène : nécrose jusqu'à l'hypoderme

5° Modifications de surface (lésions IIr)

- Croûte = coagulum (exsudation qui a séché au contact de l'air) détachée d'un bloc à la curette
- Squame = épaissement de la couche cornée (pellicule blanchâtre détachée en grattant à la curette)
Scarlatiniforme / Pytriasiforme / Psoriasiforme / Ichtyosiforme

6° Autres lésions :

- Nouure = lés° inf érythémateuse maculaire (+boule /s peau) ▪ Phénomène de Koebner = lés° sur irritat°