QCM6

Un patient a une cardiopathie valvulaire et se plaint d'une dyspnée au moindre effort, l'examen clinique note des signes d'insuffisance cardiaque globale. A quel stade de la classification de la NYHA se trouve ce patient ?

A - Classe O
B - classe I
C - classe II
D - classe III
E - classe IV

QCM7

Dans l'insuffisance ventriculaire gauche isolée la radiographie peut révéler :
A - les lignes B de Kerley
B - redistribution veineuse vers les sommets
C - hyperclarté perihilaire
D - un débord auriculaire droit
E - épanchement pleural droit

QCM8

Au plan hémodynamique l'IVG se caractérise habituellement par une ou plusieurs anomalies suivantes :
A - Baisse de la fraction d'éjection
B - Elévation des pressions du capillaire pulmonaire
C - Elévation de la pression systolique du VG
D - Augmentation insuffisante du débit cardiaque lors de l'effort
E - débit ventriculaire gauche inférieur à celui du VD

QCM9

L'HVG de type systolique se traduit à l'ECG par :
A - Augmentation de l'indice de sokolow lyon
B - Inversion des ondes T en latéral
C - Sous décalage ST dans les dérivations postérieures
D - Sous décalage de PQ
E - Ondes T amples et pointues de V1à V4

QCM10

A propos de l'HTA
Quelle est la réponse fausse ?
A - C'est un facteur de risque cardiovasculaire
B - Elle peut entraîner des complications rénales
C - L'artériosclérose est une complication de l'HTA
D - Lors de la prise de mesure de la pression artérielle la disparition des bruits correspond à la réouverture complète de l'artère
E - L'activité physique est contre indiquée chez les patients hypertendus