b. le rapport entre la pression systolique distale sur la pression systolique humérale ;
c. le rapport entre la pression systolique distale du côté droit par rapport à la pression diastolique distal du même côté ;
d. le rapport entre la pression systolique du côté droit par rapport à la pression systolique distale du côté gauche ;
e. la différence entre la pression systolique distale du côté droit et la pression humérale du même côté.

Question 19

En cas d'ischémie chronique sévère des membres inférieurs :

a. il existe une douleur à la palpation des masses musculaires ;
b. il existe un déficit moteur ;
c. il existe un déficit sensitif ;
d. il n'y a pas de déficit sensitif ou moteur ;
e. les réflexes ostéo-tendineux sont abolis.

Question 20

Les Anévrysmes de l'aorte thoracique :

a. Sont le plus souvent d'origine athéromateuse
b. Sont toujours visibles sur une radiographie du thorax
c. Peuvent être responsables d'un hémothorax en cas de rupture
d. Peuvent être à l'origine d'une embolie vers les artères cérébrales.

Question 21

Les ruptures traumatiques de l'aorte thoracique :

a. siègent le plus souvent sur l'aorte ascendante
b. doivent être redoutées en cas de fracture des deux premières côtes
c. peuvent se manifester en scanner par une image de dissection
d. sont souvent associées à un hémo médiastin

Question 22

Parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont exactes ?

a. Les IEC sont des bloqueurs du Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA)
b. Les IEC bloquent l'enzyme qui transforme l'Angiotensine I en Angiotensine II
c. Les IEC peuvent être administrés chez la femme enceinte quelque soit le terme de la grossesse
d. La toux sèche est un des principaux effets indésirables des IEC