Question 27

Au cours de l'insuffisance ventriculaire gauche, quelle que soit sa cause, l'auscultation cardiaque permet d'observer

a. Une tachycardie
b. Un bruit de galop
c. Un souffle systolique de pointe d'insuffisance mitrale fonctionnelle
d. Un click mésosystolique
e. Un souffle d'insuffisance aortique fonctionnelle

Question 28

Le reflux hépato-jugulaire :

a. Traduit une insuffisance hépatique
b. N'a de valeur que s'il est retrouvé en stricte position horizontale avec décubitus dorsal
c. S'accompagne souvent d'une expansion systolique jugulaires turgescentes
d. S'accompagne d'une augmentation des pressions veineuses et de l'OD
e. Est toujours accompagné de cyanose intense des extrémités

Citez la(ou les) bonne(s) réponse(s)

Question 29

Chez un insuffisant respiratoire chronique obstructif, une décompensation cardiaque droite peut se traduire par :

a. Un souffle d'insuffisance tricuspidien
b. Râles crépitants aux deux bases
c. Oedèmes des membres inférieurs
d. Signe de Harzer
e. Un reflux hépato-jugulaire

Citez la(les) bonne(s) réponse(s)

Question 30

Sur un tracé ECG normal on retrouve :

a. La durée de l'onde p est inférieure ou égale à 0,10 s
b. P est toujours positive en AVR
c. L'axe électrique du QRS est compris entre 0° et 90°
d. La durée de l'espace PR se situe entre 0,12 et 0,20 sec
e. La durée du QRS est supérieure à 0,12 sec.

Donnez la(les) bonne(s) réponse(s)